

COQUELUCHE

| | |
|--------------------------------|--|
| DÉFINITION | <ul style="list-style-type: none">* Infection respiratoire bactérienne très contagieuse. |
| PERIODE DE CONTAGIOSITÉ | <ul style="list-style-type: none">* Débute dès le début de l'écoulement nasal.Jusqu'à 5 jours après le début du traitement antibiotique.* Jusqu'à 6 semaines sans antibiotique. |
| MODES DE TRANSMISSION | <ul style="list-style-type: none">* Par goutellettes : en toussant, en éternuant, en parlant.* Par contact direct : peau à peau, bouche à bouche, bouche à plaie...* Par contact indirect : entrant en contact avec un objet ou des mains contaminés. |
| SYMPTÔMES | <ul style="list-style-type: none">* Malaises, perte d'appétit, écoulement nasal, larmolement et quintes de toux* Les quintes de toux sont prolongées et incontrôlables suivies de plusieurs heures sans symptômes.* Elles se terminent souvent par des vomissements.* La toux avec chant du coq (sifflement inspiratoire bruyant à la fin d'une quinte de toux) est caractéristique de la coqueluche. |
| TRAITEMENTS | <ul style="list-style-type: none">Antibiotique pour réduire la période de contagiosité.* Repos. |
| PRÉVENTION | <ul style="list-style-type: none">* Renforcer l'hygiène respiratoire.* Lavage des mains. Nettoyage et désinfection des surfaces et des jouets.* Voir un médecin qui posera le diagnostic.* Surveiller l'apparition de symptômes chez les personnes en contact et les diriger vers le médecin. |
| EXCLUSION | <ul style="list-style-type: none">* Exclure l'enfant jusqu'à la fin de la période de contagiosité. |