

## OTITE MOYENNE

<b>DÉFINITION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Infection de l'oreille moyenne.</li><li>* Survient souvent à la suite d'un rhume ou d'allergies respiratoires.</li></ul>
<b>PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* N'est pas contagieuse.</li></ul>
<b>MODES DE TRANSMISSION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* L'otite est très souvent une complication du rhume, et c'est le rhume qui se transmet d'un enfant à un autre.</li></ul>
<b>SYMPTÔMES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Fièvre et douleur.</li><li>* Pleurs et irritabilité chez le nourrisson.</li><li>* Diminution de l'appétit et réveil nocturne.</li><li>* Écoulement de l'oreille.</li></ul>
<b>TRAITEMENTS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* L'enfant doit être vu par un médecin qui décidera si des antibiotiques sont nécessaires.</li><li>* Acétaminophène, s'il y a fièvre ou douleur.</li></ul>
<b>PRÉVENTION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Donner à boire à l'enfant en position assise. Les boires donnés en position couchée favorisent le développement des otites.</li><li>* Administrer des gouttes nasales salines.</li><li>* Lorsqu'il y a un écoulement de l'oreille, tenter de contenir l'écoulement</li></ul>
<b>EXCLUSION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* État de santé de l'enfant lui permet de participer aux activités = Pas d'exclusion</li></ul>