

ROSÉOLE

DÉFINITION	<ul style="list-style-type: none">* Maladie contagieuse causée par un virus du groupe de l'herpès humain Habituellement sans danger, et les complications sont très rares. <ul style="list-style-type: none">* Généralement, l'enfant qui a eu la roséole est immunisé à vie contre ce virus.
PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	<ul style="list-style-type: none">* Avant l'éruption cutanée ou même avant l'apparition de tout symptôme.
MODES DE TRANSMISSION	<ul style="list-style-type: none">* Par goutellettes : en toussant, en éternuant, en parlant.* Par la salive ou par les sécrétions des voies respiratoires (nasales ou buccales)
SYMPTÔMES	<ul style="list-style-type: none">* Forte fièvre qui dure de 3 jours à 1 semaine.* Léger mal de gorge, nez qui coule ou les ganglions du cou enflés. Par la suite, une éruption cutanée (petites taches rosées apparaissant sur la peau qui s'étendent sur le haut du corps et du cou, et couvrent parfois le visage, les bras et les jambes. Cette éruption dure de 1 à 3 jours et n'incommodent pas l'enfant. <ul style="list-style-type: none">* s'étendent sur le haut du corps et du cou, et couvrent parfois le visage, les bras et les jambes. Cette éruption dure de 1 à 3 jours et n'incommodent pas l'enfant.
TRAITEMENTS	<ul style="list-style-type: none">* Boire beaucoup et repos.* Au besoin, pour soulager la fièvre, donnez-lui de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène Diriger vers le médecin si : <ul style="list-style-type: none">- si présence de fièvre depuis plus d'une semaine- si température corporelle dépasse 39,4 °C (102 °F)- si l'enfant présente une éruption depuis plus de 3 jours
PRÉVENTION	<ul style="list-style-type: none">* Renforcer l'hygiène respiratoire.* Renforcer les mesures d'hygiène, en particulier le lavage des mains, le nettoyage et la désinfection des surfaces, y compris les jouets.
EXCLUSION	<ul style="list-style-type: none">* État de santé de l'enfant lui permet de participer aux activités = Pas d'exclusion