

**ATTENTION, UN OU PLUSIEURS ENFANTS SONT
PRÉSENTEMENT ATTEINTS DE :**

Date : 26 octobre 2018

STREPTOCOQUE ET SCARLATINE

DÉFINITION	<ul style="list-style-type: none">* Infection de la gorge causée par la bactérie Streptocoque du groupe A.* S'il y a une éruption cutanée caractéristique, il s'agit généralement d'une scarlatine.
PERIODE DE CONTAGIOSITÉ	<ul style="list-style-type: none">* Jusqu'à 24 heures après le début du traitement antibiotique.* Si l'infection n'est pas traitée, de 2 à 3 semaines.
MODES DE TRANSMISSION	<ul style="list-style-type: none">* Par gouttelettes : en toussant, en éternuant, en parlant.* Par contact direct : peau à peau, bouche à bouche, bouche à plaie...* Par contact indirect : entrant en contact avec un objet ou des mains contaminés.
SYMPTÔMES	<ul style="list-style-type: none">* Fièvre, mal de tête, mal de gorge.* Nausées, vomissements, perte d'appétit.* Enflure des ganglions du cou et rougeur de la gorge.* S'il y a, en plus, une langue framboisée et une éruption cutanée rugueuse atteignant le cou, la poitrine et les plis des aisselles, des coudes, des aines et des genoux, il peut s'agir d'une scarlatine
TRAITEMENTS	<ul style="list-style-type: none">* Antibiotique par la bouche.Acétaminophène au besoin.* Repos, faire boire plus de liquide, diète molle et froide.
PRÉVENTION	<ul style="list-style-type: none">* Renforcer l'hygiène respiratoire.Renforcer les mesures d'hygiène, en particulier le lavage des mains, le nettoyage et la désinfection des surfaces, y compris les jouets.* S'assurer que le diagnostic a été posé par un médecin.
EXCLUSION	<ul style="list-style-type: none">* Exclure l'enfant jusqu'à 24 heures après le début du traitement.* Exclure l'enfant jusqu'à ce que son état lui permette de participer aux activités du groupe.