

VARICELLE

DÉFINITION	<ul style="list-style-type: none">* Maladie virale très contagieuse.* Plus fréquente à la fin de l'hiver et au début du printemps.
PERIODE DE CONTAGIOSITÉ	<ul style="list-style-type: none">* De 1 à 2 jours avant le début de l'éruption et jusqu'à 5 jours après.* Ou jusqu'à ce que les lésions soient croûtées.
MODES DE TRANSMISSION	<ul style="list-style-type: none">* Par voie aérienne : lorsque le microbe est présent dans des microgouttelettes ou dans les particules de poussière en suspension dans l'air pendant une longue période.* Par contact direct : peau à peau, bouche à bouche, bouche à plaie...* Par contact indirect : entrant en contact avec un objet ou des mains contaminés.
SYMPTÔMES	<ul style="list-style-type: none">* Fièvre légère.* Éruption généralisée accompagnée de démangeaisons.* L'éruption évolue dans le temps: rougeurs, vésicules, croûtes.
TRAITEMENTS	<ul style="list-style-type: none">* Selon l'état de santé de l'enfant, un médecin peut prescrire des antiviraux.* Acétaminophène pour la fièvre.* Maintenir la peau bien propre. Éviter que l'enfant ne se gratte pour éviter les cicatrices.
PRÉVENTION	<ul style="list-style-type: none">* Renforcer les mesures d'hygiène, en particulier le lavage des mains, le nettoyage et la désinfection des surfaces, y compris les jouets* Renforcer l'hygiène respiratoire.
EXCLUSION	<ul style="list-style-type: none">* État de santé de l'enfant lui permet de participer aux activités = Pas d'exclusion